

*Ueber die Störungen
der Gegenrollung der Augen bei
Erkrankungen des Ohres.*

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

in der

gesamten Medizin

verfaßt und einer


Hohen medizinischen Fakultät

der

Kgl. Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

H. Abramowitsch
aus Simferopol (Rußland)



München 1914

Buchdruckerei Max Leutner, Augustenstraße 58.

Gedruckt mit Genehmigung der hohen medizinischen Fakultät
der Universität München.

Referent:

Herr Professor Dr. Heine.

Meinen lieben Eltern
in Dankbarkeit gewidmet.

Bei zahlreichen Untersuchungen an Wirbellosen, Fischen, Vögeln, Meerschweinchen, Hunden zeigte sich, daß durch Reizung des Ohrapparates Augenbewegungen ausgelöst werden können. Auch bei Menschen entstehen bei Kopfbewegungen kompensatorische Augenbewegungen: Gegenrollung (Raddrehung) Drehnystagmus*). Desgleichen entstehen der kalorische, galvanische und Kompressionsnystagmus. Die Labyrinthzerstörung auf der einen Seite wies einen wesentlichen Unterschied in diesen kompensatorischen Augenbewegungen zwischen der gesunden und kranken Seite auf, besonders in den ersten Tagen nach der Operation. Am deutlichsten kann dieser Unterschied nach einseitigem Durchschneiden des N. acustici (N. octavus nach Ewald) wahrgenommen werden.

Wie beteiligen sich die einzelnen Teile des Ohrlabyrinths bei diesen Augenbewegungen? Die Stellung der drei Kanäle und die Konstanz dieses Verhaltens ließen schon lange ahnen, daß diese mit dem Raum und seinen drei Dimensionen in naher Beziehung stehen. Als erster fand Flourens bei der Taube, daß nach der Durchschneidung der beiden horizontalen Bogengänge Augen und Augenlider starke andauernde Bewegungen machen, daß

*) I. Unter der Gegenrollung versteht man die Bewegungen der Augen, die entstehen bei Seitwärtsneigung des Kopfes. (s. S. 7)

II. Nystagmus nennt man im allgemeinen zitternde Bewegungen des Auges, welche sich sehr rasch und wieder in derselben Weise wiederholen,

nach dem Durchschneiden der beiden frontalen die Augen andauernde heftige konvulsivische (nystagmusartige) Bewegungen aufführen. Nach Bonhardt treten gleichzeitig mit Kopfbewegungen Augenbewegungen in derselben Richtung auf. Nach dem Durchschneiden der beiden sagitalen führen die Augen Drehungen aus, deren Stärke der Stärke der Kopfbewegungen proportional ist. Was besonders die Gegenrollung betrifft, so fand Beck bei Meer-schweinchen folgendes: Die Bogengänge spielen bei der Gegenrollung die Hauptrolle; die horizontalen Bogengänge üben auf die Augenstellung in der Primärlage einen Einfluß aus. Zur Gegenrollung bei der Seitenlage gehören drei intakte Bogengänge; jeder Bogengang muß dabei mit den die Gegenrollung ausführenden Muskeln auf beiden Seiten in Verbindung stehen. Die Gegenrollung bei Drehung des Kopfes um die Querachse wird von den beiden hinteren vertikalen Bogengängen ausgelöst. Jede Gegenrollung fehlte bei der beiderseitigen Labyrinthzerstörung.

Während die Endigungen der Augenmuskelnerven gut erforscht sind, besteht über die Endigung des N. acusticus große Unklarheit. Für uns kommen hauptsächlich die Fasern des Vestibularis, Ramus anterior N. acustici in Betracht. Ramus vestibularis entsteht aus den Ganglienzellen des Ganglion Scarpae. Von hier gehen die Fasern zum Nucleus acustici dorsalis (N. vestibularis). Hier liegen drei Kerne zusammen: Nucleus triangularis (dorsalis), Nucleus Deiters (großzellig) und N. Bechterew (angularis). Früher war man allgemein der Ansicht, daß der Deiter'sche Kern die Vermittlung zwischen Labyrinth und Auge übernehme. Nach den letzten Untersuchungen (Kohnstamm und Quensel) hat der Ramus anterior N. acustici nichts mit dem Deiter'schen Kerne zu tun. Der Bechterew'sche Kern ist die Ursprungsstätte des Ves-

tibularis. Ueber die Function dieses Kernes war bis zur letzten Zeit sehr wenig bekannt. Untersuchungen der letzten Autoren zufolge steigen aus ihm die wichtigsten Bahnen und gelangen in hintere Längsbündel (Fasciculus vestibulo-mesencephalicus) zu den Augenmuskelkernen. Der Nucleus triangularis (dorsalis) ist noch mit der oberen Olive verbunden, von der ein Bündel zum Abducens-kern geht.

Auf diesem Wege kommen die vom Ohrapparat ausgelösten kompensatorischen Augenbewegungen zustande. Uns interessiert hauptsächlich die Gegenrollung. Unter der Gegenrollung der Augen verstehen wir die Bewegung, die auftritt, wenn der Kopf der Schulter zu geneigt wird. Dabei führen die Augen zwei Bewegungen aus: eine rasch vorübergehende in der Richtung der Kopfneigung und eine zweite bleibende der Richtung der Neigung entgegengesetzte. Dieses Phänomen ist schon längst bekannt. Schon im Jahre 1786 fand Hunter als erster, daß die Augen bei Kopfbewegungen eine Drehung in entgegengesetzter Richtung ausführen. Dasselbe behauptete auch A. Hueck. Er konstatierte, daß die Augen bis zu 28° Neigung in ihrer Stellung in der Orbita bleiben und erst bei Steigerung der Neigung die Gegenrollung ausführten. Entschieden dagegen äußerten sich Johann Müller, Ritterich und Donders. Eine Stütze fand die Lehre von Gegenrollung, als Javal zeigte, daß Zylindergläser, die den Astigmatismus bei aufrechter Haltung des Kopfes gut korrigieren, bei Seitwärtsneigung des Kopfes dieses nicht mehr taten. A. Nagel stellte Untersuchungen an und sprach sich für die Gegenrollung aus. Woinow konnte mittels direkter Beobachtung den Winkel der Gegenrollung messen. Aber auch zu dieser Zeit wurde diese Meinung nicht von allen geteilt, und noch im Jahre 1894 wurde die Gegenrollung von Contejean und Delmas

ganz gelegnet und nur als eine Folge der Versuchsfehler angesehen. Im Jahre 1896 konnte W. Nagel durch zahlreiche eingehende Untersuchungen die Unrichtigkeit der Resultate der vorigen Autoren nachweisen und die Lehre bestätigen. Von den Arbeiten der letzten Jahre muß die von Sachs und Meller, Feildienfeld hervorgehoben werden. Bezüglich des pathologischen Verhaltens der Gegenrollung ist vornehmlich auf R. Barany's Arbeit: Gegenrollung bei Normalhörenden, Ohrenkranken und Taubstummten hinzuweisen. Er untersuchte 150 Fälle und wollte dieses Phänomen klinisch verwerten. Der Grund der verschiedenen bis in die letzte Zeit währenden Meinungen lag gewiß in der Schwierigkeit, die Gegenrollung zu beobachten und zu messen. Die meisten Forscher bedienten sich „subjektiver“ Methode, d. h. Beobachter und Untersucher war ein und dieselbe Person. Diese Methode hatte große Nachteile und konnte weder ohne Fehler noch klinisch verwertbar sein. R. Barany wollte diese Fehler vermeiden und konstruierte hiefür einen Apparat, mit welchem man mittels eines Fadekreuzes, das auf einen Irisstreifen eingestellt wird, die Gegenrollung gut beobachten und genau messen kann. Er untersuchte 19 Normalhörende und 32 Ohrenkranke, die niemals an Schwindel litten. Es stellte sich heraus, daß zwischen den Normalhörenden und Ohrenkranken, die niemals an Schwindel litten, kein Unterschied in der Gegenrollung besteht.

Die Durchschnittszahlen, die er dabei gewonnen hat, benutzte er als Ausgangszahlen und verglich sie mit Zahlen von Ohrenkranken, die an Schwindel litten. Dabei fand er bei Normalen folgende Zahlen: Maximum der Gegenrollung 16° , Minimum 4° , Durchschnitt der Gegenrollung $7,7-8,^{\circ}$. Bei den Ohrenkranken, die an Schwindel litten, fand Barany: Maximum der Gegenrollung 25° , Minimum -4° , Durchschnitt der Gegenrollung: $9,2-9,6$,

dazu große Differenzen an verschiedenen Tagen. Daraus schloß er: „klinisch bedeutungsvoll ist die Gegenrollung bei denjenigen Fällen, die an Schwindel leiden oder zu leiden vorgeben. Hier kann oft eine einmalige Untersuchung den Nachweis erbringen, daß eine organische Ursache für den Schwindel vorliegt, während ein mehrmals konstatiertes normales Verhalten der Gegenrollung mit Sicherheit entweder Simulation oder Neurose annehmen läßt. Deshalb ist die Gegenrollung besonders wertvoll in forensischen Fällen, in denen sie oft geradezu entscheidend für die Beurteilung des Falles werden kann.“ Wie wir aus diesem sehen können, soll das Phänomen der Gegenrollung nach Barany sehr wichtig sein.

Auf Anregung von Herrn Prof. Lohmann stellte ich an einer großen Zahl von Kranken Nachuntersuchungen an, die sich — wie Barany'sche Untersuchungen — auf die Gegenrollung bei Ohrenerkrankungen erstreckten. Ich habe die Untersuchung an dem Material der Kgl. Ohrenpoliklinik ausgeführt. Ich spreche dem hochgeehrten Vorstände, Herrn Prof. Heine, für die Erlaubnis, die Untersuchung auszuführen und für die Ueberlassung des reichlichen Materials meinen ergebensten Dank aus. Ich untersuchte mit dem Barany'schen Apparat in derselben Weise, wie es Barany empfiehlt. Der Gebrauch des Apparates ist, wie ich bemerke kann nicht leicht, und es kommen doch Unterschiede in einigen Graden vor. In den meisten Fällen habe ich die Gegenrollung bei 45° für rgn und lgn*) gemessen. 60° Neigung, wie es Barany empfiehlt, finde ich zu eingreifend für die meisten Kranken, um die es sich hauptsächlich handelt. Insgesamt habe ich 100 Fälle untersucht. Diese Fälle teile ich in zwei Gruppen ein: Erste Gruppe (Tabelle I) Normalhörende und Ohrenkranke, die frei von Schwindel sind; zweite

*) rgn = rechts geneigt, lgn = links geneigt.

Gruppe (Tabelle II.) Ohrenkranke, die an Schwindel leiden oder litten. Von der ersten Gruppe habe ich 63 Fälle untersucht. Schon bei der Untersuchung dieser Gruppe zeigten sich Abweichungen von den Barany'schen Zahlen. So verhalten sich die Fälle 2, 10, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 41, 43, 44, 52, 53, 60, ganz so, wie die Kranken bei Barany, die an Schwindel leiden, obwohl sie ganz frei von Schwindel waren. Die Zahl dieser Ausnahmefälle ist zu groß, um die Wichtigkeit der klinischen Bedeutung des Phänomens anzuerkennen. Auch wenn wir annehmen, daß Fehler um $1-2^{\circ}$ vorgekommen sind, so zeigen die Fälle 2, 21, 38, 52 so große Rollungszahlen, daß sie bei Beurteilung nur dieser Rollungszahlen zu der zweiten Gruppe (Ohrenkranke mit Schwindel) gerechnet werden sollten. Es ist selbstverständlich, daß ich bei der Anzahl dieser Ausnahmefälle andere Zahlen für die Gegenrollung bei Normalen erhalten habe.

Ich fand folgende Zahlen: Maximum der Gegenrollung $25^{\circ}-23^{\circ}$, Minimum $0,-5$. Durchschnitt der Gegenrollung $10^{\circ}-7,5$ durchschnittliche Summe aus rgn. und lgn. 17° . durchschnittliche Differenz zwischen rgn. und lgn. 5° .

Von der zweiten Gruppe habe ich 37 Kranke untersucht. Dabei zeigen die Fälle 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 27, 34, 35 Gleichgewichtsstörungen bei normaler Rollung. Nach Barany sind „alle Fälle, welche Gleichgewichtsstörungen ohne Nystagmus bei normaler Gegenrollung zeigen, neurotisch; einige zeigen vollständig ausgeprägte Hysterie und Neurasthenie“. Dieses dürfte doch nicht so einfach sein; zeigen ja die Fälle 5, 9 Gleichgewichtsstörungen mit normaler Rollung und dabei deutlichen Nystagmus. Da es sich um poliklinische Kranke handelte, konnte ich sie nicht mehrere Male untersuchen. Statt dessen untersuchte ich Patienten zu einer Zeit, in

welcher sie frei von Schwindel waren. Dabei zeigten diese Kranken in anfallsfreier Zeit normale Rollung. Nur der Fall 31 macht davon eine Ausnahme; auch in anfallsfreier Zeit bekam ich bei diesem Kranken große Rollungszahlen. Für die Kranken mit Schwindel fand ich folgende Zahlen: Maximum der Gegenrollung $35^{\circ} - 25^{\circ}$; Minimum $0^{\circ}, -5^{\circ}$, Durchschnitt der Gegenrollung $13^{\circ} - 9^{\circ}$, durchschnittliche Summe aus rgn. und lgn. 22° , durchschnittliche Differenz zwischen rgn. und lgn. 5° .

Was die Bedeutung des Phänomens der Gegenrollung betrifft, so möchte ich kurz zusammenfassend folgendes sagen: obwohl die klinische Bedeutung des Phänomens nicht in Abrede gestellt werden kann, so glaube ich aus meiner Untersuchung schließen zu dürfen, daß eine so weitgehende Bedeutung, wie sie ihm von mancher Seite zugeschrieben wird, nicht zukommt. Besonders muß betont werden, daß dem Phänomen in forensischen Fällen keine zwingend beweisende Bedeutung zukommt.

Zum Schlusse möchte ich Herrn Prof. Dr. Heine für die Uebernahme des Referats, Herrn Prof. Dr. Lohmann für Ueberlassung des Themas und Herrn Privat-Dozent Dr. Herzog für die Unterstützung meinen ergebensten Dank aussprechen.

Tabelle I

	Name, Alter, Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Augen	lgn	Summe	Differenz	kgr	45° rechts	45° links	Ohrbefund
1	Lehmeyer 25 J. (M.)	Kein Schwindel	2. VI. 13	r 1 l 1	6 10 9 3	16 16 12 12	4 4 6 6	341 347 374 383	331 371	Beiderseits typische Einziehungser- scheinungen links deutliche hintere Falte Otitis media acuta	
2	Dietrich Jakob 55 J. (M.)	"	17. X.	r 1 l 1	25 18 20 10	43 30	7 10 20 30	180 205 200 220	162 190		
3	Baumann Max 17 J. (M.)	"	17. VI.	r 1 l 1	5 0 4 1	5 5	5 3	164 169 224 228	164 223	R.: große zentrale Perforation, keine Secretion L.: schleimige Secretion, im vord. unter. Quadranten Perforation	
4	Aigner Anna 16 J. (W.)	"	18. VI.	r 1 l 1	4 10 5 7	14 12	6 2	180 184 199 204	170 192	R.: trockene Perforation, Verkal- kungen L.: Narbe Cerum. obt links	
5	Mühlhofer Berta 24 J. (W.)	"	18. VI.	r 1 l 1	4 4 5 3	8 8	0 2	343 347 49 54	339 46	L.: reichliche Secretion, große Per- foration	
6	Scherrer Falian 44 J. (M.)	"	19. VI.	r 1 l 1	2 7	9 9	5 5	350 352	343	Trommelfell bds. normal	
7	Poß Katharina 56 J. (W.)	"	21. VI.	r 1 l 1	10 3 11 10	13 21	7 1	23 33 30 41	20 20	Kein besond. Befund, an d. Ohren Tonsillitis chronica	
8	Schiffahrt Lilly 17 J. (W.)	"	15. X. 18. X.	r 1 l 1	7 4 4 8	11 12	3 4	226 233 192 196	222 184	R.: über d. Warzenfortsatz erstrek- kende peritonsilläre Schwellung, Druckempfindlichkeit	
9	Sedlmayer Lorenz 43 J. (M.)	"	25. VI.	r 1 l 1	6 5 5 5	11 12	1 0	210 216 195 200	205 190		

Name, Alter Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Änge	rgn	lgn	Summe	Differenz	kgr	450 rechtsgen.	450 linksgen.	Ohrbefund
10 Lechner Johann 17 J. (M.)	Kein Schwindel	24. VI.	r 20 l 9	15 11	35 20	5 2	180 143	200 152	165 132	R.: Trommelfell atrophisch Verkai- kung L. Kalkeinlagerung Perforation	
11 Lezgus Hermann 24 J. (M.)	"	23. VI.	r 8 l 8	9 10	17 18	1 2	165 197	173 205	150 187	R.: zentrale Perforation	
12 Berger Friedrich 22 J. (M.)	"	27. VI.	r 10 l 10	9 8	19 18	1 2	202 213	212 223	193 203		
13 Hochholzner Christ. 25 J. (W.)	"	27. VI.	r 10 l 12	9 9	19 21	1 3	225 173	235 185	210 162		
14 Aicher Andreas 35 J. (M.)	Nystagmus	30. VI.	r 14 l 12	12 9	26 21	2 3	45 347	59 359	33 338	R.: diffuse Rötung, hintere Falte vorgewölbt; Warzenfortsatzdruck- empfindlich	
15 Spreiter Michael 47 J. (M.)	Kein Schwindel	22. X.	r 5 l 16	0 12	5 28	5 4	165 205	170 221	163 193	Otitis media acuta links. Mastoi- ditis. Am 3. IX. 13 Antrumopera- tion. Calorisch bds. erregbar	
16 Ganz Franziska 19 J. (W.)	"	15. X.	r 10 l 7	0 2	10 9	10 5	200 245	210 252	200 243	L.: nur ein klein. ober. Rand vom Trommelfell, Paukenschleimhaut gerötet, massige Secretion Beginnende Sclerose links	
17 Geitner Johanna 19 J. (W.)	"	15. X.	r 6 l 3	2 2	8 5	4 1	210 188	210 191	208 180	R.: Totaldefekt d. Trommelfells L.: Trommelfell rest Perforation.	
18 Bergmüller Kreszentia 9 J. (W.)	"	9. X.	r 6 l 6	0 0	15 15	3 3	210 210	210 210	201 201	R.: Eitrige Secretion, fast völlige membr. Athresie L. Tiefe Narbe	
19 Wankmüller Gertrud 47 J. (W.)	"	3. X.	r 10 l 9	7 4	17 13	3 5	210 186	220 195	203 181		

	Name, Alter, Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Augen	rgn	Ign	Summe	Differenz	kgr	rechts. 45°	links. 45°	Ohrbefund
20	Seidel Vitus 64 J. (M.)	Kein Schwindel	6. X.	r	14	13	27	1	185	199	172	R.: Cerumen obt.
21	Schwab Adam	"	10. X.	r	17 20	4 10	21 30	13 10	174 190	191 210	170 180	R.: dickschleimige Secretion, Paracenteseöffnung klappt weit L.: normal
22	Baur, Josef 16 J. (M.)	"	11. X.	r	12 3	5 2	17 5	7 1	223 190	235 193	218 188	R.: trockene Perforation der M. Shz. Normal
23	Gottschall Konrad 36 J. (M.)	"	11. X.	r	4 3	3 0	7 3	1 3	208 193	212 196	205 193	Otitis media acuta links; rechts Verkalkungen
24	Proksch Otto 23 J. (M.)	"	14. X.	r	8 1	11 7	19 13	3 1	250 226	258 233	239 220	Otitis media acuta bds.
25	Oekler Georg 46 J. (M.)	"	23. X.	r	15 0	15 10	30 10	15 10	180 210	195 210	180 200	Otitis media acuta
26	Dreer Stephan 50 J. (M.)	"	29. X.	r	18 21	7 20	25 41	11 1	175 256	193 277	168 236	Otitis media acuta Kal. Prüfung bds. normale Erregbark.
27	Fischer Konrad 57 J. (M.)	"	30. X.	r	14 19	10 16	24 35	4 3	340 50	354 69	330 34	Otitis media acuta
28	Sommer Fritz 26 J. (M.)	"	31. X.	r	10 17	12 10	22 27	2 7	170 195	180 212	158 185	R.: Narbe in Membrane Shrapnelli; L.: Einziehungen, narb. Veränderung
29	Reiserzahn Josef 35 J. (M.)	"	5. XI.	r	7 8	4 10	11 18	3 2	190 215	197 223	186 205	Otitis media acuta bds.
30	Schieller Babette 21 J. (W.)	"	5. XI.	r	17 10	5 16	22 26	12 6	230 155	247 165	225 139	Radikaloperation vor ein. Jahren; Weichteilenabszeß

	Name, Alter Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Auge			Summe		Differenz	kgr	450		Ohrbefund
				rgn	lgn		rgn	lgn			rechtsgen.	linksge.	
31	Barthauer Wolfgang 36 J. (M.)	Kein Schwindel	5. XI.	r 15 l 20	r 12 l 13	r 27 l 33	r 3 l 7	r 175 l 165	3	175	190	163	Trommelfell sehr dünn R. durchscheinendes Promontorium
32	Sexl Agnes 25 J. (W.)	"	5. XI.	r 17 l 18	r 7 l 3	r 24 l 21	r 10 l 21	r 230 l 202	28	230	247	223	Sclerose bds. Kieferhöhlenentzündung
33	Wagner Peter 51 J. (M.)	"	6. XI.	r 20 l 15	r 5 l 5	r 25 l 20	r 15 l 10	r 200 l 165	35	200	220	195	Otitis media chronica
34	Oberwienner Johann 20 J. (M.)	"	7. XI.	r 12 l 11	r 10 l 8	r 22 l 19	r 2 l 3	r 40 l 183	2	40	52	30	R. chronische Eiterung, zentr. Perforation
35	Erlwein Georg 28 J. (M.)	"	8. XI.	r 7 l 5	r 0 l 3	r 7 l 8	r 7 l 2	r 206 l 158	7	206	213	206	
36	Borstein James 36 J. (M.)	"	8. XI.	r 15 l 12	r 12 l 7	r 27 l 19	r 3 l 5	r 252 l 150	3	252	267	240	Otitis media acuta rechts
37	Rohrl Babette 43 J. (W.)	"	10. XI.	r 15 l 10	r 0 l 4	r 15 l 14	r 15 l 6	r 200 l 156	5	200	215	200	
38	Zierl Antonie 51 J. (W.)	"	10. XI.	r 25 l 19	r 20 l 23	r 45 l 42	r 5 l 4	r 50 l 75	5	50	75	30	Otitis media acuta links, kal. Prüf.: Erregbarkeit bei 75 ccm 27° C.
39	Heigl Marie 16 J. (W.)	"	10. XI.	r 10 l 5	r 0 l 4	r 10 l 9	r 10 l 1	r 233 l 206	10	233	243	233	Rhinitis chron. bds.
40	Nickl Engelbert 43 J. (M.)	"	13. XI.	r 8 l 2	r 4 l 7	r 12 l 9	r 4 l 5	r 242 l 210	4	242	250	238	Sclerose links
41	Nael Kreszenz 33 J. (W.)	"	14. XI.	r 18 l 8	r 2 l 2	r 20 l 10	r 16 l 6	r 172 l 202	16	172	190	170	
								202	6	202	210	260	

Name, Alter, Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Augen	Ign	Summe	Differenz	kgr	45° rechtsgen.	45° linksgen.	Ohrbefund
42 Reitinger Anna 24 J. (W.)	Kein Schwindel	14. XI.	r 13 l 12	10 23 14 26	3	210	223 200 240 226			
43 Steinmetz Heinrich 70 J. (M.)	"	7. XI.	r 15 l 18	13 28 12 30	2 6	33 332	48 350 320			Otitis media chron. rechts, links Otitis media acuta kal. Prf.: Er- regbarkeit nach 150 ccm 27° C _p Verkalkung, Secretion links
44 Fuchs Julius 50 J. (M.)	"	19. XI.	r 20 l 17	14 34 15 32	6 2	210 230	230 247			Trommelfell bds. normal
45 Kätterle Anna	"	19. XI.	r 10 l 6	4 14 5 11	6 1	177 210	187 216			Trommelfell bds. normal
46 Ziegler Andreas 24 J. (M.)	"	20. XI.	r 8 l 9	4 12 3 12	4 6	174 216	182 225			Trommelfell bds. normal
47 Huker Magdalena 65 J. (W.)	"	1. X.	r 2 l 1	9 11 0 0	7 0	172 174	163 0			Ohrensausen, Schwerhörigk. Trom- melfell bds. normal
48 Wörten Wilhelm 39 J. (M.)	"	25. XI.	r 7 l 8	3 10 6 14	4 2	245 204	252 212			Einziehung in d. Membrana Shrap- nelli rechts L.: Atrophie im hint. Abschnitt
49 Kammerloher Kath. 21 J. (W.)	"	24. XI.	r 14 l 13	6 20 7 20	8 6	206 215	220 228			Otitis media rechts; Perforation d. Membr. Shrapnelli Normal
50 Brüderl Heinrich	"	24. XI.	r 7 l 10	6 13 5 15	1 5	181 175	188 170			Otitis media rechts
51 Stengel Paul	"	24. XI.	r 5 l 8	10 15 5 13	5 3	175 185	180 193			
52 Schrästetter Franz 18 J. (M.)	"	13. X.	r 9 l 22	3 12 8 30	6 14	183 200	192 222			Vor 2 Jahren Meningitis; seither Taubheit. Für Kal. Reize und Drehungen, bds. unerregbar

Name, Alter Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Augen	rgn	lgn	Summe	Differenz	kgr	450 rechtsgen.	450 linksge.	Ohrbefund
53 Fend Josef 34 J. (M.)	Kein Schwindel	13. X.	r 17 l 17	10 5	27 22	7 12	7 12	200 220	217 237	190 215	Mit 14 Jahren angeblich nach Gelenk- rheumatismus Auftreten von Taubheit. Trommelfell bds. normal
54 Auer Karl	"	18. X.	r 5 l 7	2 10	7 17	3 3	3 3	195 190	200 197	193 180	Absolute Taubheit für alle Ton- quellen und Pfeifen. Kal. bds. unregelmäßig
55 Baumann Josef 24 J. (M.)	"	17. XI.	r 15 l 6	0 3	15 9	15 3	15 3	215 195	230 201	215 192	K.: Secretion; zentr. Perforation L.: normal
56 Hartl Mathias 55 J. (M.)	"	16. XI.	r 10 l 9	4 12	14 21	6 3	6 3	182 226	192 235	178 214	Trommelfell bds. normal, Schwer- hörigkeit
57 Kaden Walter 19 J. (M.)	"	20. XI.	r 7 l 7	8 8	15 15	1 1	1 1	190 190	197 197	182 182	Nerv. Schwerhörigkeit
58 Schreiner Marie 45 J. (W.)	"	23. X.	r 12 l 16	5 13	17 29	7 3	7 3	205 193	217 209	200 180	Otitis media bds. Kal. Prüf.: L.: nach 150 ccm 20° C. kleinschlag. Nystagm. nach rechts Dreherregbarkeit normal
59 Eder Therese 32 J. (W.)	"	1. XII.	r 15 l 8	7 7	22 15	8 1	8 1	215 232	230 240	208 225	Schwerhörigkeit. Trommelfell bds. normal
60 Hoff Friedrich 21 J. (M.)	"	19. VI.	r 1 l 9	4 5	5 4	3 14	3 14	333 66	334 75	329 71	L.: Otitis externa, Verkalkung
61 Bühler Friedrich 19 J. (M.)	"	23. XI.	r 10 l 13	7 5	17 18	3 8	3 8	200 187	210 200	193 182	Sclerose bds.
62 Flößer Georg 31 J. (M.)	"	3. XII.	r 5 l 9	0 2	5 11	5 7	5 7	160 190	165 199	160 188	
63 Lichterfurner Franz 20 J. (M.)	"	3. XII.	r 5 l 0	2 7	7 7	3 7	3 7	200 222	205 225	198 218	

Zu Tabelle I.

1. Maximum der Gegenrollung für 45° rgn	25
lgn	23
2. Minimum der Gegenrollung für 45° rgn	0
lgn	—5
3. Maximum der Summe aus rgn und lgn	45
4. Minimum der Summe aus rgn und lgn	3
5. Durchschnittliche Summe aus rgn und lgn	17
6. Durchschnitt der Gegenrollung für 45° rgn	10
lgn	7,5
7. Maximum der Differenz zwischen rgn und lgn	21
8. Minimum der Differenz zwischen rgn und lgn.	0
9. Durchschnittliche Differenz zwischen rgn und lgn	5

Tabelle II

Name, Alter, Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Augen	rgn	lgn	Summe	Differenz	kgr	45° rechtsqgn.	45° linksqgn.	Ohrbefund
1 Braun Johanna 45 J. (W.)	Schwindel	16. X.	r 1 l 1	25 30	22 22	47 52	3 8	200 175	225 205	178 153	Trommelfell bds. stark eingezogen. Keine Eiterung
2 Werner W. 22 J. (W.)	Schwindel	4 VI. 5. VI.	r 1 l 1	19 27	13 20	32 47	6 7	201 175	220 202	188 155	R.: Totaldefekt des Trommelfells, Secretion L.: Trommelfell epidermisiert
3 Ziegler Franz 47 J. (M.)	Starker Schwindel	5. VI. 30. VI.	r 1 l 1	10 12	11 6	21 18	1 6	365 378	375 390	354 372	Vor 5 Jahren Operation. Eiterung vor und nach der Operation, Fistelsymptom
4 Hofbauer Wolfgang 66 J. (M.)	Schwindel	25. VI.	r 1 l 1	16 15	15 15	31 30	1 0	170 190	186 205	155 175	R.: deutliche Pulsation, Warzenfort- satz druckempfindlich L.: normal
5 Winter Marie 31 J. (W.)	Schwindel Nystagmus nach der gesunden Seite	16. X.	r 1 l 1	16 0	4 4	20 4	12 4	220 178	236 178	216 174	R.: Einsenkung, Cholesteatommassen rechts Fistelöffnung, aus der Eiter hervorquillt. Operation vor 4 Jahr.
6 Mayer Magdalena 24 J. (W.)	Schwindel	7. VI.	r 1 l 1	12 8	16 0	28 8	4 8	180 195	192 203	164 195	R.: zentr. Perforation, Secretion L.: Einziehungen
7 Roth Johann 22 J. (M.)	Schwindel Nystagmus	21. VI. 23. VI.	r 1 l 1	10 10	11 8	21 28	1 12	196 200	206 220	185 192	L.: Totaldefekt des Trommelfells, Secretion. Bds. Polypen. Radi- kaloperation, Fistelsymptom

	Name, Alter Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Augen	rgn	lgn	Summe	Differenz	kgm	rechts 450	links 450	Ohrbefund
8	Daxenberg Franz 35 J. (M.)	Schwindel	18. X.	r 18 l 20	18 20	0 0	18 20	18 20	218 190	236 210	218 190	Kal. Prüfung: Bds. nach 300 ccm 270 Drehnystagmus sehr groß- schlägig und intensiv. Nachnys- tagmus rechts 5 Sek., links 10 Sek. Nach 10 × Drehung
9	Schmidt Josefine 34 J. (W.)	Schwindel Nystagmus nach rechts	20. X.	r 16 l 0	16 0	4 5	20 5	12 5	210 190	226 190	206 185	L.: Totaldefekt, Secretion, Kal. Prüf. R.: 170 ccm 250 Wasser ruhen ein deutl. Nystagm. nach links L.: 60 ccm 250 verstärken d. Nys- tagm. nach rechts 300 ccm be- wirkt. Nystagm. nach links
10	Hausmann Karoline 37 J. (W.)	Schwindel Nystagmus nach links	20. X.	r 18 l 26	18 26	22 10	40 45	4 7	210 174	228 200	188 155	Fistelsymptom bei Blick geradeaus; bei Druck lebhafter Nystagm. nach links; bei Aspiration gering. Nys- tagm. nach rechts. Kal.: Verstär- kung d. Nystagm. bds.
11	Neilinger Georg 44 J. (M.)	Schwindel	29. X.	r 2 l 14	2 14	5 2	7 16	3 12	178 226	180 240	173 224	Fall auf d. Hinterkopf 1. II. 13. An- geblich Verletzung d. Mittelohres Kal. Prüf. R.: nach Verbrauch von 125 ccm 160 C Nystagm. nach links L.: nach Verbrauch von 100 ccm Nachnystagm. nach rechts Bei 10 × Umdrehung nach links grobstül. Nystagm. nach rechts v. 15 Sek., bei 10 × Umdrehung nach rechts Nachnystagm. nach links von 5 Sek. Dauer

Name, Alter, Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Augen	rgn	lgn	Summe	Differenz	kgr	rechtsgr.	linksgr.	Ohrbefund
12. Werl Franz 38 J. (M.)	Schwindel	2. X.	r 7 l 12	13 10	20 22	6	243	250	230	R.: starke Secretion, Perforation L.: Narbe, Verkalkung	
13. Wagner Balthasar 60 J. (M.)	"	2. X.	r 10 l 10	12 12	22	2	215	225	202	Trommelfell bds. normal	
14. Ruland Christ. 27 J. (M.)	"	3. X.	r 16 l 5	0 3	16 8	16	219	235	219	7. V. 13. Radikaloperation 20. VIII. Labyrinthoperation	
15. Braun Josef 53 J. (M.)	"	3. X.	r 22 l 30	18 15	40 45	4	178	200	160	V. 13. Paracentese d. r. Ohres, Seit- her eitrigem Ausfluß 24. VII. Operation	
16. Montigny Oskar 32 J. (M.)	"	8. X. 13. X.	r 6 l 7	14 14	20 21	8	209	215	195	Schwerhörigkeit, starker Schwindel- spont. kleinschlägiger Nystagmus nach links Bei Drehen nach links Nachnystagni. nach rechts	
17. Weber Friedrich 48 J. (M.)	"	4. X.	r 16 l 17	2 10	18 27	14	164	180	162	18. III. 13. Antrumoperation rechts	
18. Bäuml Marie 44 J. (W.)	"	6. X.	r 17 l 18	7 13	24 31	10	240	257	233	Otitis media acuta rechts. Kal. Prü- fung: bds. leichte Uebererregbark. bei Prüfung links Schwindelanfall	
19. Neidiger Xavier 37 J. (M.)	"	14. X.	r 7 l 6	0 4	7 10	7	243	250	243	Otitis media bds.	
20. Kuhner Georg 41 J. (M.)	"	14. X.	r 6 l 6	3 5	9 11	3	216	222	213	Radikaloperation	
						1	165	171	160		

Name, Alter Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Augen	rgn	lgn	Summe	Differenz	kgr	450 rechtsgn.	450 linksgn.	Ohrbefund
21 Schwarz Anna 22 J. (W.)	Schwindel	24. X.	r 30 l 10	0 0	30 10	30 10	30 10	100 253	220 263	190 253	Otitis media chronica links. 3 mal operiert; letzte Operation vor 4 Jahren
22 Toetzler Johann 36 J. (M.)	Starker Schwindel	18. XI.	r 6 l 3	4 6	10 9	10 3	2 3	184 235	190 238	180 229	Sclerose bds. Typ. spontan. Drehschwindel
23 Lohr Hans 28 J. (M.)	Schwindel	11. XI.	r 3 l 4	2 10	5 14	5 14	1 6	182 200	185 204	180 190	
24 Jatsch Otto 35 J. (M.)	" (Trauma)	24. VI.	r 17 l 25	11 15	23 40	6 10	6 10	173 205	190 230	162 190	Trommelfell normal (Im XII. 12 Kopft trauma; es blutete danach aus dem linken Ohr)
25 Wittmann Josef 38 J. (M.)	"	20. X.	r 17 l 13	0 12	17 25	17 25	17 1	210 200	227 213	210 188	Der P wurde von einem Radfahrer überfahren. In der darauffolgend. Nacht leichte Blutung an dem linken Ohr. R.: Trommelfell getrübt, reflexlos
26 Koller Johann 57 J. (M.)	"	1. X.	r 17	12	29	5	5	210	227	198	Schwerhörigk., die d. P. auf einen Unfall zurückführt. L.: grobe Narbe
27 Kössler Josef 18 J. (M.)	"	23. X.	r 10 l 5	0 3	10 8	10 2	10 2	180 203	190 208	180 200	Vor einigen Wochen Schädelbruch. Trommelfell bds. normal unerregbar. Cal. bds.)
28 Eder Karl 37 J. (M.)	"	29. X.	r 22 l 12	4 10	26 22	18 2	18 2	183 253	205 265	179 243	L.: Atroph. Trommelfell Drehung n. rechts, Nachingstagn. n. links (teinschlägig), nach links Nachingstagn. nach rechts (grobschlägig)

Name, Alter, Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Augen	rgn	lgn	Summe	Differenz	kgr	rechtsgen. 49°	linksgen. 49°	Ohrbefund
29 Basché Josef 44 J. (M.)	Schwindel	6. XI.	r 13 l 17	10 12	23 29	3 5	180 224	193 241	170 212		Redits Narbe Otitis media chronica links
30 Huber Alois 50 J. (M.)	Schwindel früher, jetzt ang. frei	7. X	r 16 l 6	12 5	28 11	4 1	232 235	248 241	220 230		Vor 10 Jahren Incision R.: Narbe, Trommelfell typisch ein- gezogen
31 Haas Josef 48 J. (M.)	jetzt frei	9. X.	r 24 l 20	20 25	44 45	4 5	216 195	240 215	196 170		R.: 26. II. 13. Operation
32 Schmidt Karl 25 J. (M.)	"	9. X.	r 19 l 10	8 8	22 18	10 2	240 216	256 226	234 208		Otitis chronica media rechts. Starkes Fistelsymptom
33 Fröhlich Franz 11 J. (M.)	jetzt frei	9. X.	r 16 l 9	0 10	16 19	16 1	220 180	236 189	220 170		3. X. 13. Radikaloperation 9. VI. 13. Operation
34 Kleeberger Emanuel 53 J. (M.)	Schwindel	20. XI.	r 8 l 12	0 11	8 23	8 1	175 193	183 205	175 182		Sclerose rechts Otitis media links
35 Rechenmacher Math. 46 J. (M.)	jetzt frei	22. XI.	r 16 l 7	10 10	26 17	6 3	220 197	236 204	210 187		Radikaloperation vor 14 Jahren
36 Huile Franz 32 J. (M.)	Schwindel früher jetzt frei	28. XI.	r 7 l 9	8 10	15 19	1 1	228 165	235 174	220 155		
37 Evert Aloisia 13 J. (W.)	Schwindel früher jetzt frei	1. XII.	r 14 l 7	6 -5	20 2	8 12	206 235	220 242	200 240		Links Radikaloperation im vorigen Jahre

Zu Tabelle II.

1. Maximum der Gegenrollung für 45^0 rgn	35
lgn	25
2. Minimum der Gegenrollung für 45^0 rgn	0
lgn	-5
3. Maximum der Summe aus rgn und lgn	52
4. Minimum der Summe aus rgn und lgn	2
5. Durchschnittliche Summe aus rgn und lgn	22
6. Durchschnitt der Gegenrollung für 45^0 rgn	13
lgn	9
7. Maximum der Differenz zwischen rgn und lgn	30
8. Minimum der Differenz zwischen rgn und lgn.	0
9. Durchschnittliche Differenz zwischen rgn und lgn	5

Literatur.

1. R. Barany, Ueber die vom Ohrlabyrinth ausgelöste Gegenrollung der Augen bei Normalhörenden, Ohrenkranken und Taubstummen. Archiv für Ohrenheilkunde, 1905. Bd. 68.
 2. R. Barany, Apparat zur Messung der Rollbewegungen des Auges. Zeitschrift für Sinnesphysiol. Bd. 45.
 3. M. Bartels, Ueber Regulierung der Augenstellung durch den Ohrapparat. Archiv für Ophthalmol. 1910. Bd. 76.
 4. W. v. Bechterew, Ergebnisse der Durchschneidung des N. acusticus nebst Erörterung der Bedeutung der semicirkul. Kanäle für das Körpergleichgewicht. Pflügers Archiv. 1883. Bd. 30.
 5. Beck K., Experimentelle Untersuchungen über die Abhängigkeit der kompens. Augenbewegungen von Ohrapparaten. Verhandl. d. deutsch. otolog. Gesellsch. 1911. Frankfurt a. M.
 6. W. Nagel, Ueber die kompensat. Raddrehungen der Augen. Zeitschrift f. Psych. und Physiol. der Sinnesorgane. Bd. 12.
 7. Feilchenfeld, Zur Lageschätzung der seitl. Kopfneigungen.
 8. Sachs und Meller, Ueber die optische Orientierung bei Neigung des Kopfes gegen die Schulter.
 9. v. Stein, Die Lehre von den Funktionen der einzelnen Teile des Ohrlabyrinths.
 10. Kohnstamm und Quensel, Ueber den Kern des hinteren Längsbündel. Neurolog. Zentralblatt 1908.
-

Lebenslauf.

Geboren bin ich, H. Abramowitsch zu Simferopol am 11. März 1890. Ich besuchte dort das Gymnasium, welches ich im Jahre 1909 mit Reifezeugnis verließ. Ich ging nach Deutschland, widmete mich der Medizin und studierte zehn Semester in München.
